

Plusieurs démarches contre cette colonisation

Les méthodes les plus efficaces restent la prévention et la vigilance : il faut protéger les secteurs qui n'ont pas encore été colonisés.

Surveiller et prévenir !

Attention à ne pas la disséminer lors du transport de foin contenant des plantes en graine.

➤ Secteurs non colonisés

Ouvrir l'oeil et agir vite

Dès son apparition, il convient d'arracher les jeunes plants avant qu'ils ne s'implantent et aient le temps de donner des fruits.

Afin d'éviter tout risque de reprise, on prendra garde à enlever la totalité du système racinaire.

Eviter le "colportage"

La dissémination de l'espèce se fait de deux manières : par les nombreuses graines produites ou par régénération de fragments de racine.

Aussi des précautions sont à prendre lors du transport de terres potentiellement infestées, mais également lors du travail de la terre ou du transport de foin.

➤ Secteurs colonisés

L'arrachage est la technique la plus efficace sur les secteurs faiblement infestés. Il est à renouveler sur plusieurs années avec déterrage de tout le système racinaire.

Lorsque les plants sont trop nombreux, le fauchage sous l'inflorescence avant fructification (de mai à août) permet de limiter sa propagation. Il est à réaliser plusieurs fois dans la saison.

Enfin, le bunias supportant peu l'ombrage et la concurrence, la revégétalisation des sites infestés avec des plantes indigènes couvrantes permet de limiter son expansion.

Zone agricole

En zone agricole, il convient procéder au fauchage des zones infestées. De plus, réduire les fertilisations excessives et les perturbations du sol limite sa propagation.

➤ Ne pas propager

Évitez la fauche tardive qui favorise sa propagation par la dissémination des graines viables plusieurs années.

